
EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata
Buenos Aires, Argentina

Nuevos registros para avifauna uruguaya

Arballo, E.
1990

Cita: Arballo, E. (1990) Nuevos registros para avifauna uruguaya. *Hornero* 013 (02) : 179-187

de pocos minutos, lo que permitió aproximaciones de hasta un metro.

Se trata probablemente de una especie en expansión en Argentina.

Tyrannustyrannus:

De esta especie fue observado un grupo de 15 a 20 individuos, el 13 de Enero de 1986 en el cruce de Orán a Pichanal, departamento Orán, Salta. Esta bandada estaba en la copa de un árbol de gran porte, en un lugar abierto.

Olrog (1979) menciona que esta especie a sido capturada en Jujuy, Tucumán y Formosa; sin citar Corrientes, en donde también había sido capturada (Partridge 1963). Luego se agregan dos citas para Misiones (Konig 1979 y Narosky 1983).

BIBLIOGRAFIA CITADA

- Bo, N. A. 1965. Notas preliminares sobre la avifauna del noreste de San Luis. Hornero 10: 251-268.
de la Peña, M. R. 1988. Nuevos registros o aves poco citadas para Santa Fe. Nuestras Aves 16: 17-18
Konig, C. 1979. Presencia de *Tyrannus tyrannus* en Misiones. Hornero 12: 55-56.
Masramón, D. O. 1983. Lista de aves del nordeste de San Luis. Hornero N° Extraord.: 77-87.
Narosky, S. 1983. Registros nuevos o infrecuentes de aves argentinas. Hornero 12: 122-126.
—, y D. Yzurieta. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asoc. Ornitológica del Plata. B. Aires.
Navas, J. R. 1961. El Pato de ala azul, *Anas discors*, capturado en la Argentina. Neotrópica 7: 52.
Nores, M. y D. Yzurieta. 1981. Nuevas localidades para aves argentinas. Hist. Nat. 2: 33-42.
Olrog, C. C. 1972. Adiciones a la avifauna Argentina. Act. Zool. Lilloana 26: 255-266.
—, 1979. Nueva lista de la avifauna Argentina. Opera Lilloana 27: 1-324.
Partridge, W. H. 1963. Nota sobre un ave nueva para la fauna Argentina. Neotrópica 9: 64.
Storer, R. W. y F. B. Gill. 1961. El Pato de ala azul, *Anas discors*, observado en la provincia de Buenos Aires. Neotrópica 7: 92.

* Bv. Sarmiento 698, 5900 Villa María, Córdoba, Argentina.

Nuevos registros para avifauna uruguaya

Eduardo Arballo*

ABSTRACT.- New records for birds of Uruguay.

The distribution of rare or seldom observed bird species in Uruguay is extended. The country represents a southern distribution limit for some species, and others are threatened. The observations given here are the result of many surveys to several points of the country.

En esta comunicación se amplía la distribución conocida para el Uruguay de algunas aves consideradas raras o difíciles de observar, muchas veces por ser nuestro territorio el límite de distribución de varias especies. Se actualizan algunas citas antiguas o imprecisas, incluyéndose algunos registros recientes de aves consideradas vulnerables o amenazadas.

Este trabajo es el resultado de diversos viajes de estudio realizados a distintos puntos de

nuestro país y el mismo fue presentado en forma oral en la V Reunión Iberoamericana de Conservación y Zoología de Vertebrados (25-30 de Julio de 1988 Montevideo, Uruguay) y en cuyos resúmenes aparecen parte de los resultados.

LISTA DE ESPECIES

Bubulcus ibis

El primer registro para el Uruguay fue en el año 1976 referente a un ejemplar colectado por Gómez Haedo (Gore y Gepp 1978), desde esa mención a la fecha, la especie se ha extendido notablemente por todo el territorio. El 14 Nov 1987 se encontró una colonia nidificante de esta especie junto con *Egretta alba* y *Egretta thula* en bañados cercanos a la localidad de Lascano, Dpto. Rocha.

Tigrisoma lineatum

Un individuo fue observado en el monte ribereño del Arroyo Malo, cerca de la localidad de Curtina, en el sur del Dpto. de Tacuarembó el 27 Mar 1986. Otro individuo fue registrado al borde de un arrozal en los Bañados de San Miguel el 14 May 1988, y otro en un arrozal junto




Figura 1. Mapa del Uruguay con las principales localidades citadas en el texto.

1. Establecimientos El Espinillar; 2. Cerro Travieso; 3. Curtina; 4. La Concordia; 5. Juan Lacaze; 6. Balneario Kiyú; 7. Playa Pascual; 8. Playa Penino; 9. Parque Lecoq; 10. Rincón de Buschental; 11. Marindia; 12. Minas; 13. Parque de Vacaciones de UTE; 14. Laguna José Ignacio; 15. Laguna de Rocha; 16. Laguna Negra; 17. Bañados Las Maravillas; 18. La Coronilla; 19. Bañados de San Miguel; 20. Lascano; 21. Bañados de India Muerta; 22. Paso de Almería; 23. Pueblo Cebollatí; 24. Gral. Enrique Martínez; 25. Quebrada de los Cuervos; 26. Cerro de las Cuentas.

a la Ruta 15 cerca de pueblo Cebollatí el 17 Jun 1989; estos dos últimos lugares pertenecen al Dpto. de Rocha. La especie estaba registrada para los Dptos. de Artigas y Salto (Cuello y Gerzenstein 1962).

Botaurus pinnatus

Un individuo fue observado en bañados cercanos a Playa Pascual, Dpto. de San José, en las siguientes oportunidades: 1º Dic 1984, 22 Dic 1984, 13 Jul 1985. El 28 Set 1986 se encontraron dos ejemplares. La especie era conocida para los Dptos. de Canelones y Rocha (Gore y Gepp 1978).

Phimosus infuscatus

Esta ave fue considerada como ave de paso migratoria, visitante invernal (Gore y Gepp 1978). Una colonia de nidificación se encontró en bañados de India Muerta a unos 12 Km al sureste de Lascano el 16 Oct 1987 y otra fue ubicada en bañados cercanos a la localidad de Barrancas el 14 Nov 1987; en esta oportunidad estaba asociado con *Egretta alba*, *Egretta thula* y *Bubulcus ibis*, encontrándose dos nidos parasitados por *Heteronetta atricapilla*. Ambas localidades pertenecen al Dpto. de Rocha.

Dendrocygna bicolor

Una bandada de siete individuos, fue registrada en bañados frente al Cerro de las Cuentas, junto a la Ruta 7, en el Dpto. de Cerro Largo, el 23 Ago 1987. La especie era conocida para los Dptos. de Rocha, Canelones y Río Negro (Cuello y Gerzeinstein 1962), San José (Barattini y Escalante 1971), Treinta y Tres y Maldonado (Gore y Gepp 1978).

Anas bahamensis

Dos individuos fueron observados en el Establecimiento El Espinillar, en el Dpto. de Salto, el 4 Jun 1988. La especie era conocida para los Dptos. de Rocha, Treinta y Tres (Cuello y Gerzeinstein 1962) y Paysandú (Gore y Gepp 1978).

Accipiter striatus

Un individuo fue registrado en el monte ribereño del Río Arapey próximo a la desembocadura, (Dpto. Salto), el 4 Jun 1988. Otro individuo fué visto en el Río Yaguarón, Dpto. de Cerro Largo, el 1º Nov 1987. La especie era conocida para los Dptos. de Montevideo, San José, Canelones, Maldonado, Rocha, Paysandú y Tacuarembó (Cuello y Gerzeinstein 1962).

Buteo albicaudatus

Un ejemplar fué observado en el camino a Cerro Travieso en el noroeste del Dpto. de Tacuarembó el 14 Abr 1987. Otro fué registrado un poco más al Norte, sobre el arroyo Laureles, el 11 Dic 1987 y otro individuo en el Valle Edén en el mismo Dpto., el 14 Dic 1987. Mientras otro ejemplar se vió cerca del Arroyo Yacuy, en el Dpto. de Artigas, el 3 Jun 1988. La especie era conocida para los Dptos. de Rocha (Cuello 1966), Rivera (Gerzenstein 1967) y Maldonado (Gore y Gepp 1978).

Parabuteo unicinctus

Un ejemplar fue registrado en el Rincón de Buschental, sobre el monte marginal del Río San José en el Dpto. homónimo, el 24 Ago 1985. La especie había sido citada para los Dptos de Montevideo (Barattini y Escalante 1958), Salto, Florida, Canelones y Maldonado (Cuello y Gerzenstein 1962).

Circus cinereus

Dos ejemplares se observaron en el Parque Lecoqc, Dpto. de Montevideo, el 30 Mar 1985. La especie era conocida para los Dptos. de Florida, Paysandú, Rivera, Cerro Largo (Barattini y Escalante 1958), Rocha (Cuello y Gerzenstein 1962), Canelones y Maldonado (Gore y Gepp 1978).

Geranospiza caerulescens

Un individuo fue observado en el monte marginal del Arroyo Malo cerca de la localidad de Curtina, Dpto. Tacuarembó, el 25 Mar 1986. Otro ejemplar fue visto en el Arroyo Laureles norte del Dpto. de Tacuarembó, el 12 Dic 1987. La especie era conocida para los Dptos. de Salto, Paysandú, Artigas y Treinta y Tres (Gore y Gepp 1978).

Milvago chimachima

Un juvenil fue visto en el Establecimiento El Espinillar, Dpto. de Salto, el 2 jun 1988. La especie era conocida para los Dptos. de Artigas y Tacuarembó (Cuello y Gerzenstein 1962), Río Negro y Maldonado (Gore y Gepp 1978).

Falco femoralis

Una pareja fue registrada en las cercanías del Arroyo Yacuy, en el Dpto. de Artigas el 3 Jun 1988. La especie estaba citada para los Dptos. Paysandú (Barattini 1945), Colonia (Barattini y Escalante 1958), Tacuarembó, Salto, Río Negro, Florida, Rocha y Treinta y Tres (Cuello y Gerzenstein 1962) y Durazno (Gore y Gepp 1978).

Laterallus melanophaius

Desde 1925 no se tenían registros sobre esta especie. El 22 Mar 1986 fue observado y fotografiado un ejemplar en un bañado cercano a Playa Pascual, Dpto. de San José y el 5 Jun 1988 fue visto otro ejemplar en un bañado el Establecimiento El Espinillar, en el Dpto. de Salto. La especie era conocida sólo para el Dpto. de Montevideo (Cuello y Gerzenstein 1962, Escalante 1983).

Laterallus leucopyrrhus

Un ejemplar se encontró en el Parque Lecoqc, Dpto. de Montevideo, en las siguientes oportunidades: 27 Ene, 3 Feb y 30 Mar, de 1985. En la Laguna del Cisne, Dpto. de Canelones se observó otro individuo en dos oportunidades, el 11 Ene 1986 y el 20 Set 1987. Dos individuos más fueron observados en un bañado de Playa Penino, Dpto. San José, el 14 Feb 1987. Para esta especie ha habido muy pocas citas anteriormente: Melo, Dpto. Cerro Largo (Barlow y Cuello 1964), Arroyo Tropa Vieja, Dpto. Canelones (Escalante 1983) y Gruta de los Helechos, Dpto. Tacuarembó (Arballo y Cravino 1986).

Coturnicops notata

Un individuo fue observado en una pradera inundable en el Parque Lecoqc, Dpto. de Montevideo, el 31 Mar 1985. El 18 Ene 1986 fue visto otro ejemplar cautivo en una granja cercana a Juan Lacaze, Dpto. de Colonia, el cual había sido colectado en un rastrojo de trigo en la referida granja junto a dos pichones más en Dic. 1985. La especie era conocida para los Dptos de Rocha y Durazno (Escalante 1983).

Cariama cristata

Un individuo fue registrado en el Parque de Vacaciones de UTE ubicado en una zona serrana cercana a la ciudad de Minas, Dpto. de Lavalleja. La especie era conocida para los

Dptos. de Artigas, Salto, Cerro Largo (Cuello y Gerzenstein 1962), Tacuarembó, Treinta y Tres (Barlow y Cuello 1964) y Maldonado (Gore y Gepp 1978).

Pluvialis squatarola

Un individuo fue registrado junto con 15 *Pluvialis dominica* en Playa Penino, Dpto. de San José, el 22 Mar 1986. La especie había sido citada para los Dptos. de Rocha, Maldonado y Canelones (Cuello y Gerzenstein 1962).

Micropalama himantopus

Un individuo fue observado en la barra de la Laguna de Rocha el 12 Oct 1987 y nueve individuos más fueron vistos en un campo húmedo cercano a la intersección de la Ruta 14 con el Cno. a Barrancas, el 14 Nov 1987, ambos en el Dpto. de Rocha. La especie era conocida para los Dptos. de Canelones y Colonia (Cuello y Gerzenstein 1962), Maldonado y San José (Gore y Gepp 1978).

Bartramia longicauda

Cinco ejemplares fueron observados a los lados de la Ruta 5 en el km 229, Dpto. de Durazno, el 14 Dic 1987. La especie es considerada como un raro visitante veraniego, citada para los Dptos. de Rocha, Canelones y Colonia (Cuello y Gerzenstein 1962).

Phalaropus tricolor

Un grupo de once individuos fue observado en la Laguna José Ignacio, Dpto. de Maldonado, el 10 Oct 1987. La especie ha sido citada para los Dptos. de Colonia y Canelones (Vaz-Ferreira y Gerzenstein 1961, Cuello y Gerzenstein 1962).

Sterna hirundo

Existen muy pocos registros para esta especie en el Uruguay (Escalante 1970). En Playa Penino, Dpto. de San José, el 22 Mar de 1986 fueron vistos dos individuos, el 14 Feb 1987 ocho, el 29 Mar 1987 dos y el 7 Ene 1989 uno.

Columbina talpacoti

Para esta especie sólo hay registros para el Dpto. de Salto (Vaz-Ferreira et al. 1981). Doce ejemplares fueron observados en las Sierras de San Miguel, Dpto. de Rocha, el 14 de May 1988 y dos individuos en el Río Cebollatí cerca del pueblo E. Martínez, límite de los Dptos. de Rocha y Treinta y Tres.

Leptotila rufaxilla

Un individuo fue observado en el Río Arapey cerca de la desembocadura, Dpto. de Salto, el 3 Jun 1988. Cuatro individuos fueron registrados además en el Paso Almería, Río Cebollatí, el 15 Oct 1988 y dos más cerca de la desembocadura, el 17 Jun 1989; el primero en el Dpto. de Lavalleja y el segundo en el Dpto. de Rocha. La especie era conocida para los Dptos. de Artigas, Tacuarembó y Paysandú (Cuello y Gerzenstein 1962).

Tapera naevia

Dos ejemplares fueron observados en el Parque Lecoqc, Dpto. de Montevideo, el 26 Oct y 28 Dic 1985, además el 25 Ene 1986. Otro individuo fue registrado en el balneario Marindia, Dpto. de Canelones, el 9 Nov 1985 y otro fue visto en el Río Yaguarón, Dpto. de Cerro Largo, el 1º Nov 1987. La especie ha sido citada para los Dptos. de Artigas (Cuello y Gerzenstein 1962), Colonia (Gerzenstein 1967), Maldonado, San José, Río Negro y Rocha (Gore y Gepp 1978).

Asio flammeus

Se registraron tres individuos en campos próximos al balneario Kikú, costa del Río de la Plata, Dpto. de San José, el 14 Ago 1988. La especie ha sido citada para los Dptos. de Salto, Río Negro, Rocha, Canelones, Paysandú y Maldonado (Gore y Gepp 1978).

Melanerpes candidus

Dos individuos fueron observados en Rincón de Buschental, Dpto. de San José, el 1º Oct 1988 y un individuo fue visto en el Establecimiento El Espinillar, Dpto. de Salto, el 4 Jun 1988. La especie era conocida para los Dptos. de Colonia, Paysandú y Cerro Largo (Cuello y Gerzenstein 1962) y Maldonado (Gore y Gepp 1978).

Campephilus leucopogon

Un individuo fue visto y otro escuchado en el Arroyo El Espinillar, Dpto. de Salto, el 2 Jun 1988. La especie estaba registrada para el Dpto. de Artigas (Cuello y Gerzenstein 1962).

Synallaxis cinerascens

Un ejemplar fue observado en las márgenes del Río Cebollatí, cerca de la desembocadura, Dpto. de Rocha, el 18 Jun 1989. La especie había sido citada para los Dptos. de Cerro Largo y Artigas (Cuello y Gerzenstein 1962).

Certhiaxis cinnamomea

Un individuo fue observado en La Concordia junto al Río Uruguay, Dpto. de Soriano, el 16 Feb de 1986 y otro en bañados de India Muerta en el Dpto. de Rocha, el 17 Oct 1987. La especie era conocida sólo para el Dpto. de Durazno (Cuello y Gerzenstein 1962).

Asthenes pyrrholeuca

Dos individuos fueron observados en el Establecimiento El Espinillar, Dpto. de Salto, el 6 Jun 1988. El único registro para la especie era para el Dpto. de Colonia (Palerm 1971 b).

Asthenes hudsoni

Un ejemplar fue observado en el Establecimiento El Espinillar, Dpto. de Salta, el 6 Jun 1988. La especie era conocida para los Dptos. de Durazno y Flores (Palerm 1971 b), Paysandú, Río Negro y Colonia (Gore y Gepp 1978).

Muscisaxicola macloviana

Un individuo fue observado en campos pedregosos cercanos al Río Dayman, Dpto. de Paysandú, el 3 May 1987 y otro individuo fue visto en una lengua arenosa del Río Cebollatí, próxima a la desembocadura, Dpto. de Rocha, el 19 Jun 1989. La especie estaba citada para los Dptos. de Montevideo y Maldonado (Gore y Gepp 1978).

Knipolegus lophotes

Dos individuos fueron observados en las cercanías del Arroyo Cordobés, Dpto. de Cerro Largo, el 22 Ago 1987. La especie había sido citada para los Dptos. de Treinta y Tres (Sanborn 1929), Riviera, Tacuarembó, Lavalleja y Maldonado (Cuello y Gerzenstein 1962) y Canelones (Gore y Gepp 1978).

Fluvicola pica

Un ejemplar fue registrado en Playa Penino, Dpto. de San José, el 16 Nov 1985. La especie había sido citada para los Dptos. de Soriano, Río Negro y Montevideo (Cuello y Gerzenstein 1962).

Empidonomus varius

Un ejemplar fue observado en el km 503 de la Ruta 14 cerca de la Coronilla, Dto. de Rocha, el 7 Feb 1988. La especie es conocida para los Dptos. de Lavalleja (Palerm 1971a), Río Negro y Rocha (Gore y Gepp 1978).

Empidonomus aurantioatrocristatus

Un individuo fue encontrado en el monte ribereño del Río Yaguarón, Dpto. de Cerro Largo, el 11 Ene 1987. La especie era conocida para los Dptos. de Colonia, Artigas, Tacuarembó, Paysandú y Salto (Gore y Gepp 1978).

Sublegatus modestus

Un ejemplar fue registrado en las márgenes de Río Cebollatí, próximo a la desembocadura, Dpto. de Rocha, el 18 Jun 1989. La especie está citada para los Dptos. de Colonia, Salto, San José y Maldonado (Gore y Gepp 1978).

Petrochelidon pyrrhonota

Seis individuos frente vistos en bañados en el km 297 de Ruta 8, Dpto. de Treinta y Tres, el 2 Nov 1987. Unos 600 individuos fueron observados además en el bañado Las Maravillas, Dpto. de Rocha, el 6 Feb 1988 y un grupo de 60 en Playa Penino, Dpto. de San José, el 7 Ene 1989. La especie era conocida para los Dptos. de Artigas y Colonia (Gore y Gepp 1978).

Anthus chii

Once ejemplares fueron observados junto a la Laguna Negra, Dpto. de Rocha, el 8 Jul 1988 y otros dos en el Bañado Las Maravillas en el mismo Dpto., el 14 Oct 1988. La especie era conocida para los Dptos. de Artigas, Canelones y Cerro Largo (Vaz-Ferreira y Gerzenstein 1961, Cuello y Gerzenstein 1962).

Xanthopsar flavus

Dos individuos fueron registrados en un bañado cercano a la Quebrada de los Cuervos, Dpto. de Treinta y Tres, el 19 Dic de 1986. Dos bandadas de 32 y 28 ejemplares respectivamente fueron vistos en los Bañados de India Muerta, Dpto. de Rocha, el 17 Oct y 5 Dic 1987. Cuarenta individuos fueron observados además en un bañado cercano a la ciudad de Rocha, el 10 Dic 1988.

Pipraeidea melanonota

Un individuo fue observado en el Arroyo Laureles, Dpto. de Tacuarembó, el 12 Dic 1987, también fueron registrados cinco individuos en Marindia, Dpto. Canelones, el 7 Ago 1988. La especie estaba registrada con citas antiguas para los Dptos. de Canelones y Florida (Tremoleras 1920), Colonia (Cuello y Gerzenstein 1962) y Maldonado (Gore y Gepp 1978).

Tangara preciosa

Dos ejemplares fueron vistos en el Río Yaguarón, Dpto. de Cerro Largo, el 24 Ago 1987 y cuatro individuos en el Parque de Vacaciones de UTE, Dpto. de Lavalleja, el 28 Set 1987. La especie era conocida para los Dptos. de Artigas, Rivera y Tacuarembó (Cuello y Gerzenstein 1962), Rocha (Gore y Gepp 1978) y Treinta y Tres (Gambarotta 1985b).

Saltator coerulescens

Un ejemplar fue visto en las cercanías del Paso de las Cadenas, sobre el Río Arapey, Dpto. de Salto, el 4 Jun 1988. La especie era conocida para los Dptos. de Soriano (Vaz-Ferreira y Gerzenstein 1961) y Río Negro (Gore y Gepp 1978).

Gubernatrix cristata

Ocho individuos fueron encontrados en islas de monte cercano al Río Daymán, en el noroeste del Dpto. de Paysandú, el 2 May 1978, La especie ha sido citada para los Dptos. de Rocha, Treinta y Tres, Lavalleja y Río Negro (Cuello y Gerzenstein 1962).

Passerina brissonii

Una hembra fue registrada en la Quebrada de los Cuervos, Dpto. de Treinta y Tres, el 3 Mar 1987. La especie estaba citada para los Dptos. de Río Negro (Gore y Gepp 1978) y Maldonado (Gambarotta 1985a).

Sporophila collaris

Unos 50 ejemplares fueron vistos en los Bañados de India Muerta, Dpto. de Rocha, el 17 Oct 1985 y el 16 Oct 1987. Dos individuos más fueron observados en los Bañados de San Miguel, en el mismo Dpto., el 14 May 1988. La especie estaba citada para los Dptos. de San José, Cerro Largo (Cuello y Gerzenstein 1962) y Treinta y Tres (Gambarotta 1985b).

Sporophila palustris

Dos ejemplares fueron observados en tres oportunidades en los Bañados de India Muerta, Dpto. de Rocha, en las siguientes fechas: 17 Oct 1985, 22 Nov 1986 y 5 Dic 1987. La especie está citada para los Dptos. de Artigas y Rocha sobre la Laguna Negra (Cuello y Gerzenstein 1962).

Volatinia jacarina

Seis ejemplares fueron observados en el km 503 de la Ruta 14, Dpto. de Rocha, el 7 Feb 1988. La especie era conocida para el Dpto. de Artigas y Salto (Vaz-Ferreira et al. 1981).

AGRADECIMIENTOS

Al guardaparque J. Gambarotta por la colaboración en campaña y por la traducción del resumen. Al Prof. R. Vaz-Ferreira y Lics. F. Rilla y F. Achaval por permitirme participar de las salidas de campo de Dpto. de Zool. Vert. de la Fac. de Hum. y Ciencias. También a los Dres. J. Fernández, J. Cravino y L. Doño y a A. Barca, A. Azpiros, J. Abente y G. Acosta y Lara con quienes realicé algunas de las observaciones en forma conjunta. Así como a A. Olmos e I. Verdier por la concreción de varias salidas de campo.

BIBLIOGRAFIA CITADA

- Arballo, E. y J. Cravino. 1987. Nido de Burrito de Patas Rojas, en Tacuarembó (Uruguay). *Nuestras Aves* 14: 21.
- Barattini, L. P. 1945. Las aves de Paysandú. *Anales Lic. Dep. de Paysandú*. Año 1: 28.
- . y R. Escalante. 1985. La fauna indígena. Catálogo de las aves uruguayas, 1. Falconiformes. Mus. D. A. Larrañaga, Conc. Deptal. Montevideo.
- . y —. 1971. La fauna indígena. Catálogo de las aves uruguayas, 2. Anseriformes. Mus. D. A. Larrañaga, Int. Municipal, Montevideo.
- Barlow, J. C. y J. Cuello. 1964. New records of Uruguayan birds. *Condor* 66:516-517.
- Cuello, J. 1966. First specimens of *Buteo albicaudatus* and *Chordeiles minor* in Uruguay. *Condor* 68: 301.

- , y E. Gerzenstein. 1962. Las aves del Uruguay. Lista Sistemática, distribución y notas. Com. Zool. Mus. Hist. Nat. Montevideo 6: 1-191.
- Escalante, R. 1970. Aves marinas del Río de la Plata y aguas vecinas del Océano Atlántico. Barreiro y Ramos S. A. Montevideo.
- . 1983. Catálogo de las aves uruguayas. pte. 3. Galliformes y Gruiformes. Intend. Munic. de Montevideo, Mus. Dámaso A. Larrañaga.
- Gambarotta, J. C. 1985a. Nuevas Observaciones de Aves Uruguayas: *Aratinga acuticaudata acuticaudata* (Psittaciformes: Psittacidae), *Turdus albicollis paraguayensis* y *Cyanocoma cyanea sterea* (Passeriformes; Turdidae y Fringillidae) CIPFE=CED orione, Cont. Biol., 12: 7-8, Montevideo.
- 1985b. Presencia de *Mimus triurus* (Mimidae) y *Tangara preciosa* (Thraupidae) en el ambiente urbano y nuevo registro de *Sporophila collaris* (Emberizidae) para Uruguay (Passeriformes), Act. Jorn. Zool. Uruguay p. 79.
- Gerzenstein, E. 1967. Nuevos datos sobre la avifauna uruguaya, Hornero 10:454-458.
- Gore, M. E. y A. R. M. Gepp. 1978. Las aves del Uruguay. Mosca Hnos. Montevideo.
- Palerm, E. 1971a. El género *Empidonomus* (Passeriformes, Tyrannidae), en el Uruguay, con mención de una nueva especie para nuestro territorio. Bol. Soc. Zool. Uruguay 1:21-23.
- . 1971b. El género *Asthenes* (Passeriformes, Furnariidae), en el Uruguay, con mención de una nueva especie para nuestro territorio. Bol. Soc. Zool. Uruguay 1:45-47.
- Sanborn, C. C. 1929. Some Uruguay records. Auk 46: 251.
- Tremoleras, J. 1920. Lista de las aves uruguayas. Hornero 2: 10-25.
- Vaz-Ferreira, R. y E. Gerzenstein. 1961. Aves nuevas o poco conocidas de la República Oriental del Uruguay. Com. Zool. Mus. Hist. Nat. Montevideo.
- . E. Palerm., F. Achaval, A. Gepp y M. Huertas. 1981. Notas sobre algunas aves del área de Salto Grande (Margen uruguaya). Res. Jorn. Cien. Nat. Montevideo 2:41-42.

* Vera 2708/901, 12000 Montevideo, Uruguay.